



# Buscapina

COMPOSITUM NF

HIOSCINA N-BUTILBROMURO /  
ACETAMINOFEN.

F. de manufactura  
F. de vencimiento

# Buscapina

# Buscapina

COMPOSITUM NF  
HIOSCINA N-BUTILBROMURO / ACETAMINOFEN.

Niños Niños


Niños Niños

Alivio efectivo de molestias y dolores abdominales.

ANTIESPASMÓDICO Y ANALGESICO.



Venta libre



## Composición

Cada 1 ml. (20 Gotas) contiene:  
Hioscaina N-Botibromuro 2 mg.  
Acetaminofén 100 mg.  
Excipientes c.s

## Recomendaciones

Consérvese a una temperatura no superior a 30° C.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.

## Dosis Bebes

| Edad (Meses) | Cantidad Gotas | Veces al día |
|--------------|----------------|--------------|
| 2-3          | 8              | 2            |
| 4-11         | 16             | 4            |

## Dosis Niños

| Edad (Años) | Cantidad Gotas | Veces al día |
|-------------|----------------|--------------|
| 1-2         | 24             | 4            |
| 2-4         | 32             | 4            |
| 5-7         | 48             | 4            |
| 8-10        | 64             | 4            |

## Precauciones y Advertencias



Hipersensibilidad a los componentes.

Adminístrese con precaución a pacientes con insuficiencia renal o hepática, taquicardia, glaucoma, hipertrofia prostática, ileoparalítico, estenosis pilórica, obstrucción intestinal y apendicitis.

Venta libre

# Buscapina

COMPOSITUM NF  
HIOSCINA N-BUTILBROMURO / ACETAMINOFEN.

Niños Niños

Fabricado por:  
Pharmetique S. A.  
Bogotá D. C., Colombia.  
Distribuido por :  
Boehringer Ingelheim S. A.  
Bogotá D. C. Bajo licencia de  
Boehringer Ingelheim international GmbH.  
Ingelheim am Rhein Alemania.  
Reg. San. No. INVIMA  
2002 M-004553 R2.


Venta libre

# Buscapina


# Niños

## Instrucciones de Uso.


### Bebes.



1 Recueste al bebe sobre una superficie de tal manera que este quede mirando hacia arriba.



2 Coja el frasco-gotero con la boquilla hacia abajo y con el dedo indice presione sobre la base para que salga la cantidad de gotas que usted desea.




3 Mientras el bebe tenga la boca abierta aplique la cantidad de gotas que se necesiten de acuerdo a las instrucciones.


### Niños.



1 Si el niño es mayor de un (1) año sientelo de tal forma que pueda inclinar la cabeza hacia atras.



2 Coja el frasco-gotero con la boquilla hacia abajo y con el dedo indice presione sobre la base para que salga la cantidad de gotas que usted desea.



3 Abra la boca del niño y aplique la cantidad de gotas necesaria de acuerdo a la edad del niño y la tabla de dosis.

## Dosis

### Dosis Bebes



| Edad (Meses) | Cantidad Gotas | Veces al día |
|--------------|----------------|--------------|
| 2-3          | 8              | 2            |
| 4-11         | 16             | 4            |

### Dosis Niños



| Edad (Años) | Cantidad Gotas | Veces al día |
|-------------|----------------|--------------|
| 1-2         | 24             | 4            |
| 2-4         | 32             | 4            |
| 5-7         | 48             | 4            |
| 8-10        | 64             | 4            |