

Reg. San. No. INVIMA 2009 M-0009203

VENTA SIN FÓRMULA MÉDICA.



Consérvese en un lugar fresco y seco.
No almacenar a más de 30°
Manténgase fuera del alcance de los niños

Elaborado por Bayer S.A., Cali - Colombia,
Bajo control de Bayer consumer Care AG,
Basilea - Suiza.
Dir.Téc. Dr. Álvaro Saldarriaga QFU de A.



Bayer

Canesten® Crema

**ANTIMICÓTICO
Clotrimazol 1%**

EFICAZ TRATAMIENTO CONTRA EL PIE DE ATLETA Y HONGOS EN LA PIEL.



20g

Canesten®
ANTIMICÓTICO
Clotrimazol 1%

Crema 20g

MEDICAMENTO ESCENCIAL

PARA USO EXTERNO, APLÍQUESE MEDIANTE FRICCIONES. ® Marca Registrada.

COMPOSICIÓN: Cada 100 g de crema contienen 1 g de Clotrimazol

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. (externa)

DOSIFICACIÓN: Local, 2 a 3 veces diarias. Continuar el mismo tratamiento durante dos semanas después de la desaparición de los síntomas.

CONTRAINDICACIONES

ADVERTENCIAS:
Hipersensibilidad al Clotrimazol.

INDICACIONES: Antimicótico cutáneo. Manejo de la pañalitis por hongos o pañalitis micótica. Si no se obtiene la mejoría deseada consultar al médico.



Tel. 018000 122937 - Colombia,
o visite nuestra página web:
www.bayerandina.com -
www.canesten.com

Canesten® Crema

**ANTIMICÓTICO
Clotrimazol 1%**

EFICAZ TRATAMIENTO CONTRA EL PIE DE ATLETA Y HONGOS EN LA PIEL.



20g

Canesten®
ANTIMICÓTICO
Clotrimazol 1%

Crema 20g

MEDICAMENTO ESCENCIAL

Canesten® Crema

**ANTIMICÓTICO
Clotrimazol 1%**

EFICAZ TRATAMIENTO CONTRA EL PIE DE ATLETA Y HONGOS EN LA PIEL.



20g

MEDICAMENTO ESCENCIAL

PARA USO EXTERNO, APLÍQUESE MEDIANTE FRICCIONES. ® Marca Registrada.

COMPOSICIÓN: Cada 100 g de crema contienen 1 g de Clotrimazol

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. (externa)

DOSIFICACIÓN: Local, 2 a 3 veces diarias. Continuar el mismo tratamiento durante dos semanas después de la desaparición de los síntomas.

CONTRAINDICACIONES

ADVERTENCIAS:
Hipersensibilidad al Clotrimazol.

INDICACIONES: Antimicótico cutáneo. Manejo de la pañalitis por hongos o pañalitis micótica. Si no se obtiene la mejoría deseada consultar al médico.



Tel. 018000 122937 - Colombia,
o visite nuestra página web: www.bayerandina.com - www.canesten.com

ANTIMICÓTICO Clotrimazol 1%

COMPOSICIÓN: Cada 100 g de crema contienen 1 g de Clotrimazol

EFICAZ TRATAMIENTO CONTRA EL PIE DE ATLETA Y HONGOS EN LA PIEL.




Con su fórmula de amplio espectro, combate de manera efectiva todos los hongos que afectan la piel.

- Se absorbe rápidamente sin dejar rastros ni olor.
- Tiene una óptima penetración hasta los estratos más profundos de la piel.
- Indicada para la piel irritada o con excoriaciones.

Aplicación

Antes de colocar Canesten crema, limpie bien la zona afectada, deje secar y luego aplique el medicamento frotando suavemente hasta que la mayoría desaparezca. Use una cantidad suficiente de medicamento para cubrir la zona afectada. Lávese las manos después de aplicar el medicamento.



LAVAR LA ZONA

SECAR LA ZONA

APLICAR CREMA

FRICCIONAR

LAVAR MANOS.

Posología:

Aplíquese 2 o 3 veces al día.

Continuar el mismo tratamiento durante dos semanas después de la desaparición de los síntomas.

Indicaciones:

Antimicótico cutáneo. Manejo de la pañalitis por hongos o pañalitis micótica. Si no se obtiene la mejoría deseada consultar al médico.

Es de importancia su empleo suficientemente prolongado.

La duración del empleo depende de las dimensiones y localización de la afección. Por lo general es para:

Dermatomicosis: 4-8 semanas.

Candidovulvitis y candidobalanitis (sólo debe usarse CANESTEN® crema): 1-2 semanas.

Eritrasma y pitiriasis versicolor: aproximadamente 3 semanas.

Tiña pedis o pie de atleta: para evitar recaídas, se deberá, a pesar de una rápida mejoría subjetiva, proseguir el tratamiento hasta aproximadamente 2 semanas después de remitir todos los síntomas de enfermedad. Tras cada lavado de pies, se deberán secar éstos muy bien (espacios interdigitales).



ELIMINA HONGOS Y BACTERIAS

AYUDA A RESTAURAR LA PIEL

ALIVIA RASQUIÑA Y QUEMAZÓN

¿Cómo Prevenirlo?



1. Siempre lava y seca muy bien tus pies, sobretodo entre los dedos.



2. Utiliza todos los días medias limpias y de materiales frescos.



3. Utiliza zapatos en los lugares públicos, nunca camines descalzo.

Contraindicaciones y advertencias:

Hipersensibilidad al Clotrimazol.

Nunca interrumpa el tratamiento sólo por que los síntomas desaparecen. Siga orientación del médico o del farmacéuta.