

Pfizer

# TERRAMICINA\*

OXITETRACICLINA + POLIMIXINA B  
Ungüento Oftálmico 10g



Pfizer

# TERRAMICINA\*

OXITETRACICLINA + POLIMIXINA B

Ungüento Oftálmico 10g

Elab:  
Exp:  
No. de  
Lote:

TERRAMICINA\*  
OXITETRACICLINA + POLIMIXINA B

Pfizer

Pfizer



Almacénese a temperatura inferior a 30°C en lugar fresco y seco.



Manténgase fuera del alcance de los niños.

R. S. INVIMA 2006M-003899-R1  
Elaborado por Pfizer Ltda., São Paulo, Brasil  
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
Pfizer S.A. de Bogotá, Colombia.  
Autorizado de Pfizer Inc.  
\* Marca de fábrica de Pfizer Inc.

Pfizer



## COMPOSICIÓN

Cada 100 g de ungüento contienen: Oxitetraciclina HCL equivalente a 500mg de Oxitetraciclina y Polimixina B sulfato equivalente a 1'000.000 U.I. de Polimixina B.



## DOSIS

A juicio del médico tratante.



## CONTRADICCIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes  
En bebés y niños hasta los 8 años puede causar decoloración permanente de los dientes y retardo en el crecimiento del esqueleto.



## MODO DE USO

Dependiendo de la indicación del médico tratante y el tipo de infección, la terramicina puede tener un uso interno y otro externo.


### USO INTERNO

①



Lave muy bien sus manos con agua y jabón.

②



Abra el producto.

③



Con mucho cuidado utilice sus dedos índice y corazón para jalar el párpado hacia abajo.

④




Aségurese que la boquilla está limpia, después acérquela a la parte interior del párpado y aplique el producto en la zona afectada.

⑤



Espere de 1 a 2 minutos hasta que se le aclare la vista

⑥



Cierre el producto.


### USO EXTERNO

①




Lave muy bien sus manos con agua y jabón.

②




Abra el producto.

③




Ponga un poco de ungüento en uno de sus dedos

④



Aplique el producto en la zona afectada.

⑤



Cierre el producto.



# TERRAMICINA\*

OXITETRACICLINA + POLIMIXINA B

Ungüento Oftálmico 10g

Exp:



Almacénese a temperatura inferior a 30°C



Manténgase fuera del alcance de los niños.



#### COMPOSICIÓN

Cada 100 g de ungüento contienen: Oxitetraciclina HCL equivalente a 500mg de Oxitetraciclina y Polimixina B sulfato equivalente a 1'000.000 U.I. de Polimixina B.



#### DOSIS

A juicio del médico tratante.



#### CONTRADICCIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes  
En bebés y niños hasta los 8 años puede causar decoloración permanente de los dientes y retardo en el crecimiento del esqueleto.

R. S. INVIMA 2006M-003899-R1  
Elaborado por Pfizer Ltda., São Paulo, Brasil  
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
Pfizer S.A. de Bogotá, Colombia.  
Autorizado de Pfizer Inc.  
\* Marca de fábrica de Pfizer Inc.