

lote
Vence
Manuf.:

**Buscapina
Compositum Ampollas**
3 ampollas de 5ml



Cada ampolla de 5 ml contiene:

Hioscina N-Butilbromuro 0,02g
Antiespasmódicos y antiinflamatorios

Dipirona sódica 2,50g.
Analgésico. Antipirético. Espasmolítico.

Posología: la que el médico señale.

La forma parental es restringida para ser usada solo en instituciones prestadoras de salud tales como : EPS, IPS Y ARS

Para dolores : Posquirúrgicos, cáncer, quemaduras musculoesquelético agudo, cólicos viscerales

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los componentes
Hipertrofia
Glaucoma
Íleo paralítico
o estenosis pilórica

Advertencias

Administrar con precaución a pacientes con taquicardia puede producir agranulocitosis a veces fatal

Ver más al interior de la caja

Prescripción exclusiva por especialista

Venta con fórmula Médica.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Consérvese en lugar fresco y seco a una temperatura no superior a 30°C

Reg. San No. INVIMA 2010M-003172-R3

Fabricado por : Boehringer Ingelheim España S.A., con domicilio en Barcelona, España.

Importado y distribuido por: Boehringer Ingelheim S.A Bogotá D.C., Colombia.

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Alemania.

**Buscapina
Compositum
3 Ampollas**



Buscapina® Compositum

HI OSCINA N-BULTILBROMURO 0,02g / DIPIRONA SÓDICA 2,50g

3 Ampollas de 5 ml

Para inyección intramuscular o intravenosa (lenta) no subcutánea.

MEDICAMENTO ESENCIAL



**Boehringer
Ingelheim**

**Buscapina
Compositum Ampollas**

3 ampollas de 5ml

Venta con fórmula Médica.

**Buscapina
Compositum Ampollas**
3 ampollas de 5ml

MEDICAMENTO ESENCIAL
Venta con fórmula Médica.

ES

¿Para que sirve una ampolla de Buscapina Compositum?

- Dolor agudo post-operativo o post-traumático
- Dolor de tipo cólico.

Y ADMINISTRACION

vía
parenteral.
5min



Para cólico intenso

Dolor post operativo

Buscapina Compositum debe administrarse únicamente por vía intravenosa. Si es necesario, puede aplicarse 2 o 3 veces al día en intervalos de varias horas, sin sobrepasar los 60 mg de

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

¿Cómo y cuándo debe administrarse?

Indicaciones:
- Pacientes con antecedentes de cólicos de hipersensibilidad
- Pacientes que han tenido:
- Astenia o urticaria. (sensibilidad)
- Pacientes con glaucoma, hipertrofia de próstata, retención urinaria.
- Pacientes de porfiria aguda y deficiencia congénita de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa
Contraindicaciones:
- Astenia grave.
- Bradicardia grave.
- Hipertensión arterial pronunciada

Efectos secundarios y precauciones en el empleo

¿Qué ocasiona la interrupción inmediata del medicamento?

INDICACIONES

LISTA DE EXCIPIENTES
Acido tartático Agua bidedilada

CONTRAINDICACIONES

No deberá añadirse el contenido de la ampolla a soluciones intravenosas de gran volumen correctoras del pH o para nutrición parenteral (aminoácidos, lípidos).

Debido a la posibilidad de aparición de incompatibilidades, Buscapina® Compositum no debe mezclarse con otros fármacos en la misma jeringa.

CONTRAINDICACIONES

PERIODO DE VALIDEZ 5 años

Mantengase fuera del alcance de los niños

Conservese en un lugar fresco y seco a una temperatura no superior a 38°C

Venta con Formula Médica.

ADVERTENCIAS

Reg. San. No. INVIMA 2010M-003172-R3

Boehringer Ingelheim España S.A. con domicilio en Barcelona España.

Distribuidor: Boehringer Ingelheim S.A. Bogotá D.C., Colombia.

Boehringer Ingelheim GmbH Ingelheim am Rhein Alemania.

