






Lote / Batch: Exp: 


SOBREDOSIFICACION:
 La sobredosis con Acetaminofén puede causar falla hepática. Cualquier tipo de sobredosis debe ser manejada médicamente en forma inmediata, así no se encuentren presentes en el momento signos o síntomas de sobredosificación.

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES
 - No utilizar en Embarazo y Lactancia.
 - Administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, en pacientes con hipertensión, diabetes mellitus, trastornos de la tiroides, isquemia del miocardio, brnquial, retención urinaria debido a hipertrofia de la próstata.
 - En pacientes con diagnóstico previo de enfermedad hepática o renal debe haber una evaluación médica antes de iniciar el tratamiento.
 - Al administrar las dosis ocasionales no tienen efectos significativos, el uso regular diario y prolongado de Acetaminofén puede potencializar el efecto anticoagulante de la warfarina y otras cumarinas incrementando el riesgo de sangrado.
 - El producto puede causar somnolencia, por eso se recomienda no manejar vehículos ni maquinaria pesada. No ingerir bebidas alcohólicas, ya que el alcohol aumenta sus efectos en el SNC.
 - No tome el producto por más de 3 días, a menos que sea indicado por el médico.
 - El uso prolongado puede ser perjudicial.
 - No utilizar junto con otros medicamentos que contengan Acetaminofén, descongestionantes u otros productos para el resfriado.

 USUARIO	 DOSIS	 + 12 AÑOS
 ADMINISTRACION	 CADA 6 HORAS	 MAX. 6 TABLETAS EN 24 HORAS

COMPOSICION Cada tableta contiene:	Acetaminofén	500 mg
	Clohidrato de Feniramina	5 mg
	Clorfeniramina	2 mg
	Antihistamínicos indicados en el tratamiento de procesos alérgicos	

dolex
GRIPA


Fabricado en Panamá por GlaxoSmithKline Panamá, S.A para GlaxoSmithKline Colombia, S.A.
 Importado por GlaxoSmithKline Colombia, S.A., Bogotá D.C., Colombia
 Contáctenos: 01-8000-118686



12 TABLETAS 

dolex
GRIPA

TRIPLE ACCIÓN → 1. Descongestionante
 → 2. Antihistamínico
 → 3. Analgésico

 **dolex**
GRIPA

Venta sin Fórmula Médica.
 Manténgase lejos del alcance de los niños
 No use el producto si el sobre está dañado o abierto.
 No bote esta caja. Contiene información importante que debe ser leída.
 Almacéñese por debajo de 30°C

El medicamento es Dolex Gripa de GSK. El ejercicio busca entender la información presente en el empaque y entenderla como un sistema que comunica al usuario la manera de consumir el medicamento al igual que las advertencias y contraindicaciones.

La aproximación al ejercicio parte de lo fundamental; entender que el empaque funciona como un sistema de información donde si alguna pieza falla puede llevar a un uso erróneo del producto por parte del consumidor. Además se busca una operación que consolide la imagen del producto, para que este sea fácilmente reconocible como un producto competente.

En primera instancia el procedimiento partió de observar los diferentes niveles de lectura y de información presentes en el empaque. De tal manera se sacaron conclusiones sobre que piezas de información se presentan a si misma jerárquicamente. El primer nivel fue identificado como el nombre del producto, su logotipo. El segundo nivel consta de las palabras que describen su función. El tercer nivel aplica para la información que explica que dentro de su función existen 3 tipos de acción. Por último se encuentran una imagen ilustrando que son tabletas, el numero que contiene el empaque y el logo de la farmacéutica. Todo lo anterior respecto al frente del empaque. Al dorso se encuentra la composición química de la pastilla dentro del primer nivel y luego las advertencias y contraindicaciones todo escrito en bloque de texto.

Una vez identificada la información y su jerarquía, se procedió a observar la estética visual del producto. Fondo azul claro con tipografía en blanco y amarillo, y algunas marcas en naranja-rojo. La decisión partió de mantener la paleta de colores intacta, al igual que la tipografía con el fin de mantener el producto fácilmente reconocible. La intención fue dirigida principalmente a la reorganización de información para que se presente de manera rítmica al ojo y la mirada no se pierda. Se optó por dejar simplemente Dolex Gripa como el nombre del medicamento. Esto para facilitar la lectura y evitar unas palabras de orden menor entre las palabras Dolex y Gripa. Debajo de la palabra Gripa se enumeraron las 3 acciones que efectúa el medicamento. Se suprimió la imagen de las tabletas puesto que era confuso y simplemente se mantuvo el numero de tabletas contenidas dentro del empaque. Por ultimo, se trasladó una frase ubicada al respaldo hacia la esquina inferior izquierda del frente. Se reorganizó a manera de listado con un chulo al lado para representar la eficacia del remedio.

En el respaldo lo cambios fueron dados principalmente por la reubicación de la tabla que contiene la composición química, mientras que el bloque de texto se justificó y se centró sobre una retícula. También se aprovechó para ubicar la fecha de vencimiento en la parte inferior del respaldo para que así se más fácil de identificar. Sin embargo si cabe una observación personal y es que el bloque de texto cuando se extiende de tal manera, se vuelve difícil de manejar y de leer. Haciendo una reflexión sobre esta pieza de información, si puede ser presentada de una manera, buscando una forma mas elocuente.

En último lugar, los costados del empaque de redistribuyeron para que a un lado se encuentren las indicaciones referentes al consumidor y al otro se encuentre la información referente al productor. Los códigos de barras se dejaron intactos al igual que la forma del empaque, siendo esta una caja plegada, en la que un costado se desaprovecha de contener información por el tipo de plegadura que hay presente allí. ¿De pronto ese costado puede utilizarse para ubicar alguna otra pieza de información?

COMPOSICIÓN Cada tableta contiene:		
Acetaminofén	500 mg	Actúa al dolor de cabeza y la fiebre.
Clorfeniramina maleato	5 mg	Reduce la congestión y obstrucción nasal.
Paracetamol	2 mg	Antihistamínico indicado en el tratamiento de prurito alérgico.

USUARIO	DOSES	ADMINISTRACIÓN
+12 AÑOS	CADA 6 HORAS	MAX. 6 TABLETS EN 24 HORAS

Uso / Batch:
Exp:

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en Embarazo y Lactancia.
- Adminístrese con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, en pacientes con hipertensión, diabetes mellitus, trastornos de la tiroidea, síndrome del corazón anillo cardíaco, epilepsia, glaucoma, bronquitis, asma bronquial, retención urinaria debido a hipertrofia de la próstata.
- En pacientes con diagnóstico previo de enfermedad hepática o renal debe haber una evaluación médica antes de iniciar el tratamiento.
- Aun cuando las dosis ocasionales no tienen efectos significativos, el uso regular diario y prolongado de Acetaminofén puede potenciar el efecto anticoagulante de la warfarina y otras cumarinas incrementando el riesgo de sangrado.
- El producto puede causar somnolencia, por eso se recomienda no manejar vehículos ni maquinaria pesada. No ingerir bebidas alcohólicas, ya que el alcohol aumenta sus efectos en el SNC.
- No tome el producto por más de 3 días, a menos que sea indicado por el médico.
- El uso prolongado puede ser perjudicial.
- No utilizar junto con otros medicamentos que contengan Acetaminofén, descongestionantes u otros productos para el resfriado.

SOBREDOSIFICACIÓN:
La sobredosificación con Acetaminofén puede causar falla hepática. Cualquier tipo de sobredosis debe ser manejada médicamente en forma inmediata, así no se encuentren presentes en el momento signos o síntomas desobredosificación.

COMPOSICIÓN Cada tableta contiene:		
Acetaminofén	500 mg	Actúa al dolor de cabeza y la fiebre.
Clorfeniramina maleato	5 mg	Reduce la congestión y obstrucción nasal.
Paracetamol	2 mg	Antihistamínico indicado en el tratamiento de prurito alérgico.

USUARIO	DOSES	ADMINISTRACIÓN
+12 AÑOS	CADA 6 HORAS	MAX. 6 TABLETS EN 24 HORAS

Uso / Batch:
Exp:

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en Embarazo y Lactancia.
- Adminístrese con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, en pacientes con hipertensión, diabetes mellitus, trastornos de la tiroidea, síndrome del corazón anillo cardíaco, epilepsia, glaucoma, bronquitis, asma bronquial, retención urinaria debido a hipertrofia de la próstata.
- En pacientes con diagnóstico previo de enfermedad hepática o renal debe haber una evaluación médica antes de iniciar el tratamiento.
- Aun cuando las dosis ocasionales no tienen efectos significativos, el uso regular diario y prolongado de Acetaminofén puede potenciar el efecto anticoagulante de la warfarina y otras cumarinas incrementando el riesgo de sangrado.
- El producto puede causar somnolencia, por eso se recomienda no manejar vehículos ni maquinaria pesada. No ingerir bebidas alcohólicas, ya que el alcohol aumenta sus efectos en el SNC.
- No tome el producto por más de 3 días, a menos que sea indicado por el médico.
- El uso prolongado puede ser perjudicial.
- No utilizar junto con otros medicamentos que contengan Acetaminofén, descongestionantes u otros productos para el resfriado.

SOBREDOSIFICACIÓN:
La sobredosificación con Acetaminofén puede causar falla hepática. Cualquier tipo de sobredosis debe ser manejada médicamente en forma inmediata, así no se encuentren presentes en el momento signos o síntomas desobredosificación.

COMPOSICIÓN Cada tableta contiene:		
Acetaminofén	500 mg	Actúa al dolor de cabeza y la fiebre.
Clorfeniramina maleato	5 mg	Reduce la congestión y obstrucción nasal.
Paracetamol	2 mg	Antihistamínico indicado en el tratamiento de prurito alérgico.

USUARIO	DOSES	ADMINISTRACIÓN
+12 AÑOS	CADA 6 HORAS	MAX. 6 TABLETS EN 24 HORAS

Uso / Batch:
Exp:

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en Embarazo y Lactancia.
- Adminístrese con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, en pacientes con hipertensión, diabetes mellitus, trastornos de la tiroidea, síndrome del corazón anillo cardíaco, epilepsia, glaucoma, bronquitis, asma bronquial, retención urinaria debido a hipertrofia de la próstata.
- En pacientes con diagnóstico previo de enfermedad hepática o renal debe haber una evaluación médica antes de iniciar el tratamiento.
- Aun cuando las dosis ocasionales no tienen efectos significativos, el uso regular diario y prolongado de Acetaminofén puede potenciar el efecto anticoagulante de la warfarina y otras cumarinas incrementando el riesgo de sangrado.
- El producto puede causar somnolencia, por eso se recomienda no manejar vehículos ni maquinaria pesada. No ingerir bebidas alcohólicas, ya que el alcohol aumenta sus efectos en el SNC.
- No tome el producto por más de 3 días, a menos que sea indicado por el médico.
- El uso prolongado puede ser perjudicial.
- No utilizar junto con otros medicamentos que contengan Acetaminofén, descongestionantes u otros productos para el resfriado.

SOBREDOSIFICACIÓN:
La sobredosificación con Acetaminofén puede causar falla hepática. Cualquier tipo de sobredosis debe ser manejada médicamente en forma inmediata, así no se encuentren presentes en el momento signos o síntomas desobredosificación.

COMPOSICIÓN Cada tableta contiene:		
Acetaminofén	500 mg	Actúa al dolor de cabeza y la fiebre.
Clorfeniramina maleato	5 mg	Reduce la congestión y obstrucción nasal.
Paracetamol	2 mg	Antihistamínico indicado en el tratamiento de prurito alérgico.

USUARIO	DOSES	ADMINISTRACIÓN
+12 AÑOS	CADA 6 HORAS	MAX. 6 TABLETS EN 24 HORAS

Uso / Batch:
Exp:

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en Embarazo y Lactancia.
- Adminístrese con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, en pacientes con hipertensión, diabetes mellitus, trastornos de la tiroidea, síndrome del corazón anillo cardíaco, epilepsia, glaucoma, bronquitis, asma bronquial, retención urinaria debido a hipertrofia de la próstata.
- En pacientes con diagnóstico previo de enfermedad hepática o renal debe haber una evaluación médica antes de iniciar el tratamiento.
- Aun cuando las dosis ocasionales no tienen efectos significativos, el uso regular diario y prolongado de Acetaminofén puede potenciar el efecto anticoagulante de la warfarina y otras cumarinas incrementando el riesgo de sangrado.
- El producto puede causar somnolencia, por eso se recomienda no manejar vehículos ni maquinaria pesada. No ingerir bebidas alcohólicas, ya que el alcohol aumenta sus efectos en el SNC.
- No tome el producto por más de 3 días, a menos que sea indicado por el médico.
- El uso prolongado puede ser perjudicial.
- No utilizar junto con otros medicamentos que contengan Acetaminofén, descongestionantes u otros productos para el resfriado.

SOBREDOSIFICACIÓN:
La sobredosificación con Acetaminofén puede causar falla hepática. Cualquier tipo de sobredosis debe ser manejada médicamente en forma inmediata, así no se encuentren presentes en el momento signos o síntomas desobredosificación.

dolex® GRIPA

TRIPLE ACCIÓN → 1. Descongestionante
→ 2. Antihistamínico
→ 3. Analgésico

dolex® GRIPA

TRIPLE ACCIÓN → 1. Descongestionante
→ 2. Antihistamínico
→ 3. Analgésico

dolex® GRIPA

TRIPLE ACCIÓN → 1. Descongestionante
→ 2. Antihistamínico
→ 3. Analgésico

dolex® GRIPA

TRIPLE ACCIÓN → 1. Descongestionante
→ 2. Antihistamínico
→ 3. Analgésico