



Ver folleto adjunto

Administre con precaución en pacientes con taquicardia, Síndrome de Gilbert.

Disturbios hepáticos moderados.

Insuficiencia renal grave (depuración de creatinina <30 ml/min).

Primer y tercer trimestre de embarazo y lactancia.

Disturbios hepáticos severos.

Enfermedad aguda o crónica.

Úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y antecedentes de angina, reacciones alérgicas a Ácido Acetil Salicílico.

Broncoespasmo, rinitis alérgica, pólipos nasales y edema.

Hipersensibilidad al principio activo o a sus excipientes.

El uso concomitante con el Ácido Acetil Salicílico incrementa el riesgo de úlcera gastrointestinal.

Hipertrofia prostática, glaucoma, riego parafítico.

estenosis pilórica y mastenita grave, úlcera péptica.

acta, insuficiencia renal y hepática.

Advertencias:

1 comprimido recubierto 3 o 4 veces al día.

Vía de administración: Oral

No debe masticarse.

Tomarlo durante o sobre las comidas con abundante agua.

Cada comprimido recubierto contiene: Hioscina
N-butilbromuro 20 mg
Ibuprofeno 400 mg

Buscapina[®]fem

Adultos y niños mayores de 12 años
Manténgase fuera del alcance de los niños
Consérvese a una temperatura no superior a 30°C

Contraindicaciones:

Fabricado por: Pharmetique S.A Bogotá D.C., Colombia
Distribuido por: Boehringer Ingelheim S.A Bogotá D.C., Colombia
Boehringer Ingelheim am Rhein, Alemania
Reg. San. No INVIMA 2006 M-000595

Vence:
Lote:
Manuf:

Buscapina[®]fem


Buscapina[®]fem

RÁPIDO ALIVIO DEL DOLOR MENSTRUAL

Buscapina[®]fem

Funciona cómo

ANTIESPASMÓDICO
ANALGÉSICO




6 Comprimidos recubiertos



Buscapina[®]fem

INDICACIONES

¿Qué es Buscapina Fem y qué hace en mi cuerpo?



POSOLOGÍA

¿Cómo consumo Buscapina Fem?



Tomar un comprimido recubierto 3 o 4 veces al día.



Vía de administración: Oral.
No debe masticarse y se recomienda tomarlos durante o sobre las comidas con abundante agua.

Adultos y niños mayores de 12 años

RECOMENDACIONES



Manténgase fuera del alcance de los niños.



Consérvese a una temperatura no superior a los 30° C.

EJERCICIOS

¿Qué actividades prácticas puedo realizar para contrarrestar el dolor?

Para el alivio de los músculos uterinos contraídos:

1

Ejercicios suaves como caminar o nadar.

2

Respirar profundamente. En posición horizontal respire profundamente de manera lenta y relajada

3

Inclinación péptica. En posición vertical y con las rodillas dobladas, balancee la pelvis hacia adelante y hacia atrás de 10 a 15 veces.

Para favorecer el flujo sanguíneo:

4

Masaje directo del útero.

Para más información visita:

http://www.buscapina.com.co/preguntas_frecuentes/ejercicios.html

BUSCAPINA®

¿En qué se diferencia Buscapina a un analgésico común?



Buscapina actúa solamente donde se desarrollan los cólicos y el dolor de este -en el abdomen.

Muchos analgésicos actúan en el cuerpo entero reduciendo la conciencia del dolor. Ingresan al torrente sanguíneo y de este modo ofrecen un mayor potencial de efectos colaterales no deseados.



Buscapina no tiene efectos colaterales.



INSTRUCTIVO

ANALGÉSICO

ANTIESPASMÓDICO

Funciona cómo

RÁPIDO ALIVIO DEL DOLOR MENSTRUAL

Buscapina[®]
fem

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

¿Cuándo **NO** debo tomar Buscapina Fem?

- 1 Hipersensibilidad al principio activo o a sus excipientes.
- 2 Broncoespasmo, rinitis aguda, pólipos nasales y edema angioneurótico, reacciones alérgicas al Ácido Acetil Salicílico o AINES.
- 3 Úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y antecedente de enfermedad ácido péptica.
- 4 Disfunción hepática severa. Insuficiencia hepática moderada.
- 5 Insuficiencia renal grave (depuración de creatinina <30ml/min).
- 6 Primer y tercer trimestre de embarazo y lactancia.
- 7 El uso concomitante con el Ácido Acetil Salicílico (ASA) incrementa el riesgo de úlcera gastrointestinal y sus complicaciones. Deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hipertrofia prostática, glaucoma, íleo paralítico, estenosis pilórica y miastenia gravis, úlcera péptica activa, insuficiencia renal y hepática.
- 8 Adminístrese con precaución en pacientes con taquicardia, Síndrome de Gilbert.

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Fabricado por: Pharmetique S.A Bogotá D.C., Colombia.

Distribuido por: Boehringer Ingelheim S.A Bogotá D.C., Colombia
Bajo licencia de Boehringer Ingelheim
International GmbH, Ingelheim am Rhein, Alemania

Registro Sanitario No. INVIMA 2006 M-0005595