

Posología

Consumo regular	
 x 12h	 x 6h-8h
Consumo Máx. diario	
 x 24h	
Límites del consumo	
 +18	 10 días
 3 días	

Fabricado en México por:
Syntex, S.A. de C.V.
Toluca, México
Importado, empaquetado y distribuido por:
Bayer S.A. Colombia
www.bayerandina.com
Tel. 01 8000 122937

Usos

Apronax® es efectivo en el control del dolor causado por inflamación y la fiebre. Útil en el dolor de cabeza, muela, menstrual, de garganta, muscular, de espalda y de articulaciones entre otros.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a sus excipientes, broncoespasmos, rinitis aguda, pólipos nasales, edema angioneurótico, reacciones alérgicas al Ácido Acetilsalicílico o AINES, úlcera péptica, sangrado gastrointestinal y antecedente de enfermedad ácido péptica, disfunción hepática severa.

Advertencias

Tercer trimestre de embarazo y lactancia, insuficiencia renal grave, (depuración de creatinina <30mL/min), insuficiencia hepática moderada, se recomienda que debe iniciar tratamiento con las dosis más bajas. El uso concomitante con el Ácido Acetilsalicílico (ASA) incrementa el riesgo de úlcera gastrointestinal y sus complicaciones. Manténgase fuera del alcance de los niños



Bayer

APRONAX®
Naproxeno Sódico 275 mg
5 tabletas

Reg. Invima 2004 M-004602 R-2
Marca registrada



APRONAX®

Naproxeno Sódico 275 mg

5 tabletas

 Bayer HealthCare

LADIPRINT

MX: 420 30 55
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

1

APRONAX®

Naproxeno Sódico 275 mg

5 tabletas

Analgésico y Antifebril

 Bayer HealthCare

Producto de venta libre



APRONAX®
Naproxeno Sódico 275 mg

 Bayer HealthCare




770212300013

FREV.	R-04-08
Dimen. mm.	55 x 21 x 75

Lote No.: X96134
F. Elab.: FAB 01 NOV 2009
F. Exp.: EXP 01 NOV 2014

Advertencias

Manténgase alejado de los niños. No se ha estudiado la inocuidad y la eficacia en los niños menores de 2 años.



Los efectos que caracterizan una sobredosis son: mareo, somnolencia, vómito y apnea principalmente. No se conoce qué dosis pudiera comprometer la vida del paciente.



Tercer trimestre de embarazo y lactancia, insuficiencia renal grave, (depuración de creatinina <30ml/min),



Contraindicaciones

Hipersensibilidad naproxeno sódico. No se debe administrar a pacientes que previamente han manifestado reacciones alérgicas con ácido acetilsalicílico u otros AINEs. En pacientes con úlcera péptica activa o hemorragia digestiva activa.

APRONAX®

Naproxeno Sódico


275 mg

Instrucciones de uso










Farmacocinética

Se absorbe de manera rápida y completa en el tracto gastrointestinal. Pasa a la sangre y se fija a las proteínas plasmáticas en un 99%, distribuyéndose en el organismo. Niveles máximos plasmáticos se alcanzan de 1 a 2 horas. Se elimina por vía renal en un 95%, sin cambios



Posología

-  Consuma la pastilla de forma oral
-  Facilite la ingestión tomando agua
-  Sienta el alivio en alrededor de 15 minutos

Dosis inicial		Consumo regular	
	10mg/kg		12h  6h-8h
Dosis siguientes	2,5-5mg/kg	Consumo Máx. diario	600 x 24h
 -18	cada 8h	Consumo Máx.	 10 días
	15mg/kg/día	Consumo Máx.	 3 días